

Désinfection des locaux des établissements de soins


Dr. Raoul BARON

RRESO
BREST le 24 mai 2007



I. Réponse et Secteur Sanitaire

- Avril 2007
 - 102 établissements de soins contactés
- Mai 2007
 - 52 réponses (51%)



I. Réponse et type d'établissement

	Contactés	Réponses (%)
CHU/CH/CHG/HIA	28	57%
CHS/Psy	13	61%
Hôpital Local	11	73%
Clinique MCO	24	42%
SSR/ELD	24	37%
Autres	2	50%

I. Réponse et statut établissement

Statut	Contactés	Réponses (%)
Public	38	61%
Privé	37	41%
PSPH	27	52 %

I. Réponse et taille établissement

Statut	Nombre de réponses
<250 lits	28
250 – 500 lits	14
> 500 lits	10

2. Entretien quotidien des locaux*

a. Réalisé par

- a. Uniquement par du personnel de l'établissement
- b. Uniquement par une entreprise extérieure
- c. Personnel de l'établissement et entreprise extérieure

35

2

15

b. Cahier des charges

- visé ou validé par l'EOHH ou le CLIN

41%

*(chambres, bloc opératoire, consultations, Laboratoires...)

3. Appareil d'entretien vapeur

- **15** établissements possèdent au moins un appareil (**29%**)

	Nbre appareils	%
CHU/CH/CHG/HIA	8	35%
CHS/Psy		
Clinique MCO	6	60%
Hôpital Local	1	7%
SSR/ELD		
Divers		

4. Techniques de désinfection utilisées

- a. Désinfection par **voie aérienne** par fumigation de formaldéhyde (appareil produit agréé)
5 (10%)
- b. Désinfection par **voie aérienne** par fumigation de désinfectants sans formaldéhyde
6 (12%)
- c. désinfection des surfaces par dispersats dirigés (**sprays**) contenant des aldéhydes
5 (10%)
- d. désinfection des surfaces par dispersats dirigés (**sprays**) ne contenant pas d'aldéhydes
23 (44%)
- e. désinfection des surfaces par autre procédé de diffusion
1 (2%)
- f. désinfection par application de désinfectant après nettoyage sur les surfaces
16 (31%)
- g. désinfection par application de détergent-désinfectant sur les surfaces, (nettoyage-désinfection)
49 (94%) **12 fois seule technique utilisée**



5. Indications de la désinfection terminale par voie aérienne

- a. Uniquement en cas de patients atteints de MDO
1 (9%)
- b. En bloc opératoire de façon systématique (exemple en fin de programme)
1 (9%)
- c. En bloc opératoire de façon non systématique (après intervention septique ou avant intervention de type pose de prothèse)
2 (18%)
- d. En secteur d'hospitalisation de façon systématique (en fin de séjour)
2 (18%)
- e. En secteur d'hospitalisation de façon non systématique (BMR)
7 (64%)
- f. Dans les locaux spécifiques dits « salles propres et environnements maîtrisés» (unités de préparations injectables stériles, laboratoire,...)
2 (18%)

41

6. Motifs de non utilisation de la désinfection par voie aérienne

- a. cadre réglementaire non cohérent avec les données de transmission des maladies infectieuses
9 (22%)
- b. absence d'indication pour la maîtrise du risque infectieux en établissement des soins
24 (59%)
- c. toxicité (formaldéhyde) pour le personnel (et pour les patients)
22 (54%)
- d. technique exigeant des contraintes pour la mise en œuvre
18 (44%)

26

7. Indications de la désinfection des surfaces par dispersats dirigés

- a. En bloc opératoire de façon **systematique** (exemple en fin de programme)
14 (54%)
- b. En bloc opératoire de façon **non systematique** (après intervention septique ou avant intervention de type pose de prothèse)
6 (23%)
- c. En secteur d'hospitalisation de façon **systematique** (en fin de séjour)
10 (38%)
- d. En secteur d'hospitalisation de façon **non systematique** (BMR)
22 (85%)
- e. Dans les locaux spécifiques dits « salles propres et environnements maîtrisés » (unités de préparations injectables stériles, laboratoire,...)
9 (35%)

26

8. Motifs de non utilisation de spray pour la désinfection des surfaces

- a. Absence d'indication pour la maîtrise du risque infectieux en établissement des soins
10 (38%)
- c. Toxicité pour le personnel (et pour les patients)
7 (27%)
- d. Technique exigeant des contraintes pour la mise en œuvre
7 (27%)

Conclusions

- Entretien des locaux réalisé par du personnel de l'établissement **67%**
- Si entretien réalisé par entreprise extérieure, CLIN ou EOHH consultés **40%**
- Nettoyeur vapeur surtout dans MCO **60%**
- DVA **21%**
 - Indication secteur Hospitalisation BMR **64%**
 - Motifs non utilisation DVA absence indication **60%**
 - toxicité **34%**
- Sprays **54%**
- Détergent-désinfectant seul **23%**



Remerciements

A l'ensemble des personnes qui ont
participé à cette enquête.